
Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 01:55

Link do produktu: https://akmed.pl/wlewnik-hydroterapia-standard-sanity-p-7161.html




Wlewnik hydroterapia STANDARD SANITY

Numer katalogowy	**7051**
Producent	**Sanity**

Opis produktu

Wlewnik hydroterapia Standard stworzony został z myślą o osobach korzystających z lewatywy bądź irygacji pochwy w warunkach domowych. Wysokiej jakości wlewnik wyposażony został w praktyczny uchwyt, oraz gwarantuje odpowiednią pojemność praktyczną w regularnej terapii. Nasz dobry wlewnik jest atestowany, certyfikowany i w stu procentach higieniczny.



1. worek z uchwytem,
2. wąż z kranikiem,
3. krótka końcówka do wykonania lewatywy doodbytniczej,
4. długa końcówka do wykonania irygacji pochwy.

Wskazania:

- przygotowanie do badania jelita grubego
- przed zabiegami chirurgicznymi
- dysfunkcje okrężnicy
- przewlekłe stany zapalne
- syndrom przewlekłego zmęczenia
- nawracające infekcje, spadek odporności
- alergie, astma
- bóle głowy i nawracające migreny
- nadwaga i otyłość
- zaburzenia układu limfatycznego, obrzęki
- choroby stawów
- profilaktycznie – wspomaganie procesów oczyszczania organizmu
- powstrzymanie procesów starzenia

Instrukcja użycia:

Użycie wlewnika i rodzaj zastosowanego płynu należy zawsze skonsultować z lekarzem. Stosować zgodnie z przeznaczeniem.

Przed użyciem należy wlewnik dokładnie umyć wodą z mydłem i wyparzyć. Nie używać uszkodzonego wlewnika. W razie ewentualnego uszkodzenia któregoś z elementów wlewnika, zniszczyć i wyrzucić wlewnik.

Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przygotowanie do zabiegu:

Jeżeli nie występują przeciwwskazania, każdy człowiek w wieku od 8 lat może poddać się zabiegowi hydrokolonoterapii. Jednak efekty zabiegów będą lepsze, jeżeli przez 3 do 5 dni przed zabiegiem zastosujemy dietę lekkostrawną i bogatą w błonnik, aby ułatwić proces oczyszczania okrężnicy.

W tym okresie zaleca się unikanie białka zwierzęcego oraz pokarmów, które pozostając na ścianach jelit powodują wzdęcia czy gazy, utrudniając przeprowadzenie zabiegu (produkty mączne czy mleczne). Należy przyjmować dużo płynów, jeść jak najwięcej warzyw, zwłaszcza zielonych, wskazane są też kasze.

Zalecenia do zabiegu:

Bezpośrednio po zabiegu należy pić dużo płynów i w ciągu pierwszych sześciu godzin jeść wyłącznie świeże warzywa oraz owoce.

W jelitach zwiększa się ilość prawidłowej flory bakteryjnej jelit, jednakże korzystne jest pobudzenie odbudowy tej mikroflory przez podawanie probiotyków przez kilka dni po zabiegu.

W celu odniesienia trwałych korzyści z zabiegu zaleca się dostosowanie diety do indywidualnego fenotypu tzw. dieta metaboliczna, dbanie o właściwą podaż płynów i zwiększenie aktywności fizycznej.